



EMCDDA Harm Reduction Initiative – Verbesserung der HCV Test- und Überweisungspraxis für Menschen die Drogen injizieren in Einrichtungen der Drogenhilfe

Wissensfragebogen für die Mitarbeitenden in der Drogenhilfe

Einleitung:

Wieviel wissen Sie über Virushepatitis und die verfügbaren Tests und Behandlungen? Dieser kurze Fragebogen hilft uns herauszufinden, bei welchen Themen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Drogenhilfe weniger sicher fühlen, damit mehr Informationen und Schulungen in diesen Bereichen angeboten werden können - und wir hoffen, dass dies für Sie eine nützliche Wissensauffrischung sein wird!

Der Fragebogen ist anonym und nicht dazu gedacht, Sie zu bewerten, so dass Sie ohne Sorge völlig ehrlich sein können.

A. Hepatitis C	wusste ich	ist neu für mich
1. Die Infektion mit dem Hepatitis C Virus ist in der Allgemeinbevölkerung in Europa wenig verbreitet (unter 2%).	()	()
2. In Europa ist der Anteil von Hepatitis C Infizierten unter Menschen, die Drogen injizieren oft hoch (meist 50% oder sogar höher).	()	()
3. Screening und Behandlung von Hepatitis C hat sowohl für die behandelten Personen als auch für andere Vorteile, da die Übertragung des Virus verringert wird.	()	()
4. Der Hepatitis C Virus wird vorwiegend durch Blut übertragen, in seltenen Fällen auch während des Geschlechtsverkehrs.	()	()

	wusste ich	ist neu für mich
5. HCV ist viel leichter als HIV durch Blut übertragbar.	()	()
6. HCV kann außerhalb des Körpers stunden- oder sogar tagelang überleben.	()	()
7. Hepatitis C kann durch die Benutzung gebrauchter Spritzen und Nadeln übertragen werden.	()	()
8. HCV kann beim Drogengebrauch auch durch das Benutzen von gebrauchten Filtern übertragen werden.	()	()
9. HCV kann beim Sniefen durch das gemeinsame Benutzen von Röhrrchen übertragen werden.	()	()
10. HCV wird nicht über Lebensmittel, Trinkwasser oder durch alltägliche Kontakte (Händchenhalten, Umarmen, Küssen) übertragen.	()	()
11. Unter Menschen die Drogen injizieren kann HCV durch gemeinsames Benutzen eines Gefäßes zum Aufziehen von Wasser für die Injektion übertragen werden.	()	()
12. HCV kann durch das gemeinsame Benutzen von Löffeln/Pfännchen, die für die Zubereitung der injizierten Drogen benutzt werden, übertragen werden.	()	()
13. Bei der ersten Stufe des HCV Testens wird untersucht ob eine Person Antikörper gegen HCV im Blut hat (um zu wissen ob sie HCV Antikörper-positiv sind).	()	()
14. Diagnostische Schnelltests, die Blut aus der Fingerkuppe oder Speichelflüssigkeit zum Nachweis von HCV-Antikörpern benutzen, sind verfügbar. Sie sind einfach zu handhaben und liefern schnelle Ergebnisse (innerhalb von 20 Minuten).	()	()
15. Anti-HCV-positiv kann entweder bedeuten, dass eine Person derzeit mit Hepatitis C infiziert ist oder dass sie in der Vergangenheit infiziert war und bereits geheilt ist.	()	()

	wusste ich	ist neu für mich
16. Um zu wissen, ob eine Person gegenwärtig infiziert ist, ist ein weiterer Bluttest erforderlich (Polymerase-Chain-Reaction (PCR) oder Core-Antigen-Test).	()	()
17. Die meisten Menschen, die Drogen konsumieren, akzeptieren nach einem Informationsgespräch ein HCV-Testangebot und möchten ihren Status wissen.	()	()
18. Für Menschen mit riskantem Drogenkonsum empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine regelmäßige HCV-Testung.	()	()
19. Menschen mit einer akuten HCV-Infektion können kurz nach der Infektion spezifische Symptome verspüren (z. B. Oberbauchschmerzen, Gelbsucht, Übelkeit), haben manchmal jedoch nur unspezifische Symptome (Müdigkeit), und oft keinerlei Symptome.	()	()
20. Eine HCV-Infektion wird in den meisten Fällen chronisch.	()	()
21. Die meisten Menschen mit chronischer Hepatitis C Infektion haben jahrzehntelang keinerlei Symptome.	()	()
22. Eine Hepatitis C Infektion kann man nicht am äußeren Erscheinungsbild erkennen.	()	()
23. Wenn eine chronische Hepatitis C unbehandelt bleibt, kann dies schwere Leberschäden hervorrufen und möglicherweise zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen.	()	()
24. Gegen Hepatitis C gibt es keine Impfung.	()	()
25. Es genügt nicht, gebrauchte Spritzen und Nadeln durchzuspülen, um sich vor einer Hepatitis C zu schützen.	()	()
26. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor der sexuellen Übertragung von Hepatitis schützen.	()	()
	wusste ich	ist neu für mich

27. Auch wenn eine Hepatitis C ausgeheilt ist (egal, ob von alleine oder mit einer Therapie), kann man sich erneut mit dem Virus infizieren. () ()

28. Auch nach Ende der Behandlung sollte regelmässig auf die Präsenz des Hepatitis C Virus getestet werden. () ()

29. Heutzutage kann Hepatitis C in fast allen Fällen geheilt werden. () ()

30. Durch die Behandlung der Hepatitis C werden gesundheitliche Langzeitfolgen vermieden. () ()

31. Die Behandlung von Hepatitis C besteht in der Einnahme von Tabletten, in der Regel über einen Zeitraum von 8 bis 12 Wochen. () ()

32. Internationale Richtlinien empfehlen allen Personen, die Drogen injizieren und bei denen eine HCV-Infektion diagnostiziert wurde, unabhängig vom Krankheitsstadium eine Behandlung anzubieten. () ()

B. Hepatitis B	wusste ich	ist neu für mich
1. Das Hepatitis B Virus (HBV) kann durch Sexualverkehr ohne Kondom oder durch Blut übertragen werden, und von Mutter zu Kind.	()	()
2. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor der sexuellen Übertragung von HBV schützen.	()	()
3. Hepatitis B kann chronisch werden, das ist jedoch viel seltener der Fall als bei Hepatitis C.	()	()
4. Vor Hepatitis B kann man sich durch eine Impfung schützen.	()	()
5. Um eine HBV-Infektion zu verhindern, sollten idealerweise drei Dosen des Impfstoffs verabreicht werden.	()	()
6. Es wird empfohlen Menschen die Drogen injizieren außer auf HCV auch auf HBV, HIV und sexuell übertragbare Krankheiten zu testen.	()	()

C. Infektionsstatus	JA	BIN MIR UNSICHER	NEIN
1. Kennen Sie Ihren Hepatitis B Status?	()		()
2. Kennen Sie Ihren Hepatitis C Status?	()		()
3. Sind Sie gegen Hepatitis B geimpft?	()	()	()

D. Weitere Informationen

1. Wie oft arbeiten Sie mit Menschen die Drogen injizieren?

- regelmässig
- gelegentlich
- nie

2. In welcher Art von Einrichtung sind Sie tätig (nur 1 Option wählen):

- Niedrigschwellige Einrichtung (z.B. gemeindenahe Schadensminderungs-Einrichtung, Drop-in, Konsumraum)
- Drogenberatungsstelle
- Stationäre Drogenhilfeeinrichtung
- Gefängnis
- Anderer Einrichtungstyp

Falls ‚Anderer Einrichtungstyp‘, bitte angeben

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

Falls Sie an weiteren Informationen über Epidemiologie, Richtlinien oder Praktiken im Bereich Hepatitis C interessiert sind, besuchen Sie bitte unsere Seite mit Ressourcen zu Hepatitis C:

<https://europa.eu/!YC89Tn>

Es ist wichtig, dass Menschen die in der Drogenhilfe arbeiten regelmäßig getestet werden und gegen Hepatitis B geimpft sind - also stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Status wissen. Sehen Sie, wo Sie sich in ihrer Nähe testen lassen können:

<https://www.ecdc.europa.eu/en/test-finder>

(23/7/2020)